

**Tabel 2**

Instandhoudingsdoelstellingen en relatieve bijdrage van de Oostvaardersplassen aan de landelijke staat van instandhouding van de vogelsoorten waarvoor de Oostvaardersplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied (Ministerie van LNV, 2006; Ministerie van LNV, 2009).

Soort	LSvI	Relatieve bijdrage *	Doelstelling		Draagkracht	
			Oppervlak	Kwaliteit	Aantal vogels	Aantal paren
<b>Broedvogels</b>						
Dodaars	+	6-15%	=	=		140
Aalscholver	+	15-30%	=	=		8000 (r)
Roerdomp	- -	6-15%	=	=		40
Woudaapje	- -	6-15%	>	>		3
Kleine Zilverreiger	+	15-30%	=	=		20
Grote Zilverreiger	+	>70%	=	=		40
Lepelaar	+	6-15%	=	=		160
Bruine Kiekendief	+	2-6%	=	=		40
Blauwe Kiekendief	- -	2-6%	>	>		4
Porseleinhoen	- -	6-15%	>	>		40
Blauwborst	+	<2%	=	=		190
Snor	- -	30-50%	=	=		680
Rietzanger	+	2-6%	=	=		790
Grote karekiet	- -	<2%	=	=		3
<b>Niet-broedvogels</b>						
Grote Zilverreiger	+	f, 30-50%	=	=	30 (sg)	
Lepelaar	+	f, 30-50%	=	=	110 (sg)	
Wilde Zwaan	-	sf, 2-6%	=	=	20 (sg)	
Kolgans	+	sf, <2%	=	=	600 (sg)	
Grauwe Gans	+	sf, 2-6%	=	=	4200 (sg)	
Brandgans	+	sf, <2%	=	=	1800 (sg)	
Bergeend	+	f, <2%	=	=	90 (sg)	
Smient	+	sf, <2%	=	=	2100 (sg)	
Krakeend	+	f, 2-6%	=	=	480 (sg)	
Wintertaling	-	f, 2-6%	=	=	1300 (sg)	
Pijlstaart	-	f, <2%	=	=	80 (sg)	
Slobeend	+	f, 15-30%	=	=	1900 (sg)	
Tafeleend	- -	s	=	=	11900 (sm)	
Kuifeend	-	s	=	=	10200 (sm)	
Nonnetje	-	s	=	=	280 (sm)	
Zeearend	+	f, 15-30%	=	=		
Kluut	-	f, <2%	=	=	100 (sg)	
Kemphaan	-	sf, <2%	=	=	210 (sm)	
Grutto	- -	sf, <2%	=	=	90 (sg)	

\* Het gebied vervult hoofdzakelijk een slaapplaatsfunctie (s), foerageerfunctie (f) of beide (sf). Relatieve bijdrage is alleen berekend als het landelijke doel en het gebiedsdoel beide zijn gebaseerd op dezelfde waarde (of seizoensmaximum óf seizoensgemiddelde)

**Legenda**

LSvI Landelijke Staat van Instandhouding (- - zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)  
s Slaapplaatsfunctie  
f Foerageerfunctie  
= Behoudsdoelstelling  
> Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling